

平成29年度 温州みかん病害虫防除暦

八女地域農業振興推進協議会果樹部会・JAふくおか八女かんきつ部会

散布日	月 時期	病害虫	農薬名	濃度	収穫前 年間回数	備考	毒性 ***
	3月 発芽前 3月	カイヨウ病	ICボルドー 66D	60倍	— —		普通 B
	4月 新梢1cm期	ソウカ病	デランフロアブル	1000倍	30日 3回		劇物 B
	5月 開花始  下旬	訪花害虫	アドマイヤーフロアブル	4000倍	14日 3回		劇物 A
		灰色カビ病	ストロビードライフロアブル	2000倍	14日 3回		普通 B
		カイヨウ病	クレフノン加用	200倍	— —	混用散布	普通 A
			コサイド3000	2000倍	— —		普通 B
		黒点病	エムダイファー水和	600倍	60日 2回		普通 B
	6月 上旬～ 中旬	カイガラムシ類幼虫	アプロード水和剤	1500倍	14日 3回	ヤノネ・サンホーゼ	普通 B
		カイガラムシ・カミキリムシ	スプラサイド乳40	1500倍	14日 4回		劇物 B
		サビダニ・スリップス	サンマイト水和	4000倍	3日 2回		劇物 C
		黒点病	ジマンダイセン水和	600倍	30日 4回		普通 B
	又はペンコゼブ水和 固着剤		アビオンE	1500倍	— —		普通 A
		ミカンハダニ	ハーベストオイル	150倍	— —		普通 A
	7月 上旬～	コナカイガラ・カミキリムシ	アクタラ顆粒水溶	3000倍	14日 3回		普通 A
		黒点病	ジマンダイセン水和	600倍	30日 4回		普通 B
			又はペンコゼブ水和 固着剤	アビオンE	1500倍	— —	
		ナシマルカイガラムシ	エルサン乳剤	1000倍	14日 2回	ヤノネカイガラ登録有	劇物 B
	8月 上旬 中旬	サビダニ・スリップス	コテツフロアブル	4000倍	前日 2回		劇物 C
		黒点病	ジマンダイセン水和	600倍	30日 4回		普通 B
			又はペンコゼブ水和				普通 B
	極早生 下旬以降	(小)黒点	キノンド-80水和	1000倍	30日 5回	極早生	普通 C
		ミカンハダニ	コロマイト水和剤	2000倍	7日 2回	応急【サビダニ】	普通 C
			●ダニコングフロアブル	2000倍	前日 1回	基本	普通 A
	9月 極早生 ～ 早生 普通	貯蔵病害	ベフラン液剤25	2000倍	前日 3回	散布量を 多くします。	劇物 A
		(腐敗防止)	ベンレート水和	4000倍	前日 4回		普通 B
		貯蔵病害	アビオンE	1500倍	— —		普通 A
			各系統とも収穫前に混用散布する。				
	12月	ミカンハダニ	オマイト水和	750倍	7日 2回		普通 A

※上野以降の品種では腐敗防止剤散布後、【20日経過】したら再散布します。

した場合は 追加散布を行います。

※ジェイエース・オルラン・オルランナック等はすべてのかんきつで使用を禁止する。

発生時の応急防除（温州みかん・中晩かん）

散布日	病害虫	農薬名	濃度	収穫前 年間回数	備考	毒性 ***
	カメムシ類	MRジョーカー水和	2000倍	14日 2回		普通 A
		アルパリン/スタークル顆粒水溶	2000倍	前日 3回		普通 A
	ナメクジ類	▲ラービソフロアブル	800倍	30日 3回	注意	劇物 B
	エカキムシ・アブラムシ・アケハ	オリオン水和40	1000倍	14日 5回		劇物 B
		モスピラン顆粒水溶剤	3000倍	14日 3回		劇物 A
	エカキムシ・アブラムシ	アクタラ顆粒水溶	3000倍	14日 3回		普通 A
	ケムシ類	ファイブスター顆粒水和剤	2000倍	前日 —		普通 A
	展着剤（台風時）	ササラ	3000倍	— —	白斑軽減	普通 A

2017/1/27 時点